


表 ロボスキンアナライザーの推移

項目	単位	塗布前	塗布4週後	経時P値
毛穴(黒ずみが目立つ毛穴)	個	676.0 ± 473.7	587.5 ± 421.2	$P = 0.026$ *
色素沈着_小(数)	個	21.9 ± 8.2	23.0 ± 9.2	$P = 0.368$
色素沈着_小(面積)	mm ²	15.7 ± 6.0	16.7 ± 6.4	$P = 0.221$
シワ(眼下)(本数)(右)	-	2.28 ± 1.63	1.85 ± 1.57	$P = 0.036$ *
赤味評価(数LV1)	個	1731 ± 625	1702 ± 640	$P = 0.700$
赤味評価(面積LV1)	mm ²	1476 ± 661	1470 ± 647	$P = 0.956$

平均値±標準偏差

n=20


※塗布前と塗布4週後を対応のあるt検定で統計解析を行った。*: $P < 0.05$ **: $P < 0.01$ ***: $P < 0.001$



平均値 ± 標準偏差
n=20

図1 毛穴(黒ずみが目立つ毛穴)の推移


※塗布前と塗布4週後を対応のあるt検定で統計解析を行った。*: $P < 0.05$ **: $P < 0.01$ ***: $P < 0.001$



平均値 ± 標準偏差
n=20

図2 色素沈着_小(数)の推移


※塗布前と塗布4週後を対応のあるt検定で統計解析を行ったが、有意差はみられなかった。



平均値 ± 標準誤差
n=20

図3 色素沈着_小(面積)の推移


※塗布前と塗布4週後を対応のあるt検定で統計解析を行ったが、有意差はみられなかった。



平均値 ± 標準誤差
n=20

図4 シワ(眼下)(本数)(右)の推移


※塗布前と塗布4週後を対応のあるt検定で統計解析を行った。*:P<0.05 **:P<0.01 ***:P<0.001



平均値 ± 標準誤差
n=20

図5 赤味評価(数LV1)の推移

※塗布前と塗布4週後を対応のあるt検定で統計解析を行ったが、有意差はみられなかった。



平均値 ± 標準誤差
n=20

図6 赤味評価(面積LV1)の推移

※塗布前と塗布4週後を対応のあるt検定で統計解析を行ったが、有意差はみられなかった。